

OXACARBAMAZEPINA

Eugenia García Mouriz. Servicio Urgencias Generales del CHN

Antiepiléptico con estructura molecular y eficacia clínica similar a la carbamazepina, con un perfil de interacciones más favorable. Su metabolismo es hepático.

La dosis habitual oscila entre 600 y 2400 mg/día.

Puede producir grados variables de sedación, mareo, hiperquinesia, ataxia, nistagmus, náuseas y vómitos e hiponatremia.

El tratamiento consiste en descontaminación digestiva con carbón activado, y tratamiento de soporte (1). A pesar de las similitudes con la carbamazepina, las recomendaciones de tratamiento no se deben extrapolar (2).

BIBLIOGRAFÍA

1. Wade J, Dang C, Nelson L, Wasserberger J. Emergent complications of the newer anticonvulsivants. *The Journal of Emergency Medicine* 2010; 38: 231-237
2. Ghannoum M, Yates C, Galvao T, Sowinski bK, Thi Hai Van Vo, Coogan A, Gosselin S, Lavergne V, Nolin T, Hoffman R. Extracorporeal treatment for carbamazepina poisoning: Systematic review and recommendations from the EXTRIP workgroup. *Clinical Toxicology* 2014; 52: 993-1004.