

Eficacia en la reducción de C-LDL frente a la prevención de eventos cardiovasculares.

Ensayo	Principio activo	C-LDL (mg/dl)					MACE-3		
		Basal		Intervención	Placebo	Diferencia	Medida del efecto	IC95%	Significación estadística
IMPROVE-IT ⁷	Ezetimiba	95	mes 12	50	67	-17	HR= 0,90	0,84 a 0,96	Sí
ODYSSEY OUTCOMES ¹²	Alirocumab	92	mes 48	66	103	-37	HR*= 0,86	0,79 a 0,93	Sí
FOURIER ¹³	Evolocumab	92	mes 48	30	88	-58	HR= 0,80	0,73 a 0,88	Sí
ORION 10 ¹⁴	Inclisirán	105	mes 17	51	106	-55	RR= 0,73	0,53 a 1,01	No
ORION 11 ¹⁴	Inclisirán	105	mes 17	58	108	-50	RR= 0,75	0,55 a 1,03	No
CLEAR HARMONY ²²	Ácido bempedoico	103	mes 12	85	100	-15	HR= 0,80	0,49 a 1,29	No
CLEAR WISDOM ²³	Ácido bempedoico	120	mes 12	100	117	-17			

RR Riesgo relativo.

HR Hazard ratio.

IC95% Intervalo de confianza del 95%.

MACE-3 Eventos cardiovasculares (muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus).

(*) Incluye la mortalidad por cualquier causa.